

NATURALIS®-L

Insectenbestrijdingsmiddel voor toepassing in de bedekte groente- & sierteelt en de bedekte & onbedekte teelt van kleinfruit.

Toelatingsnummer: 13857 N



Professioneel gebruik

BIOGARD®
biological First.

24h Noodnummer:
0031 (0)14 58 45 45

Inhoud:

1 L_e



Naturalis®-L

Werkzame stof:

Beauveria bassiana ATCC 74040

Gehalte: 2.3 x 10⁷ cfu/ml

Formulering: Olie dispersie (OD)

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Chargennummer/Formuleringdatum:

zijn verpakking

Houdbaarheid van de formulering:

1 jaar bij kamertemperatuur in ongeopende verpakking. Niet opslaan in omstandigheden met temperaturen boven de 25°C.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorschreven.

Het product mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw.

Toelatingshouder:



CBC (Europe) S.r.l.
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG)
Italië
Tel. (+39) 035 - 335313

Geïmporteerd door:



HortiPro BV
Jagerserf 43
3851 SM ERMELO
Tel.: +31 (0)341 268639
www.hortipro.com
info@hortipro.com

Wettelijk Gebruiksvoorschrift:

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Kleinfruit (bedekte teelt)	Spintmijt ¹	0.75 – 1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
Groenteteelt m.u.v. vruchtgroenten (bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	5 per teeltcyclus	15 L/ha per 12 maanden	5
Sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	5 per teeltcyclus	15 L/ha per 12 maanden	5
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)	Spintmijt ¹ , Tomatengalmijt ²	0.15% (150 ml middel in 100 L water)	1.5 L/ha	15 per 12 maanden	22.5 L/ha per 12 maanden	5
	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus		
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)	Spintmijt ¹	0.15% (150 ml middel in 100 L water)	1.5 L/ha	15 per 12 maanden	22.5 L/ha per 12 maanden	5
	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus		
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Spintmijt ¹	0.15% (150 ml middel in 100 L water)	1.5 L/ha	15 per 12 maanden	22.5 L/ha per 12 maanden	5
	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus		

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei, bessen, druif (onbedekte teelt)	Spintmijt ¹ Witte vlieg ³	0.75 – 1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips ⁴	1 - 1.5 L/ha	1.5 L/ha		22.5 L/ha per 12 maanden	
Bessen, druif (bedekte teelt)	Witte vlieg ³ Californische trips ⁴	0.75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips ⁴	1 - 1.5 L/ha	1.5 L/ha		22.5 L/ha per 12 maanden	
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt)	Spintmijt ¹ Bramengalmijt ⁵ Witte vlieg ³	0.75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips ⁴	1 - 1.5 L/ha	1.5 L/ha		22.5 L/ha per 12 maanden	
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (bedekte teelt)	Bramengalmijt ⁵ Witte vlieg ³	0.75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips ⁴	1 - 1.5 L/ha	1.5 L/ha		22.5 L/ha per 12 maanden	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken

¹ Spintmijt (*Tetranychus urticae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: de verpakking naspoelen bij het vullen van de tank wegens beperkte uitschenkbaarheid van het middel.

In de bedekte teelt van kleinfruit en de bedekte teelt van vruchtgroenten het middel toepassen in 600-1000 L water/ha. In de bedekte groenteteelt m.u.v. vruchtgroenten het middel toepassen in 200-1000 L water/ha. In de bedekte sierteelt het middel toepassen in 500 tot 1000 L water/ha.

Bevat *Beauveria bassiana* strain ATCC 74040. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Het is niet uitgesloten dat er na toepassing van het middel bij hoge luchtvochtigheid nuttige insecten geïnfecteerd worden met *Beauveria bassiana*. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachtijden.

De verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

De gewasveiligheid van Naturalis®-L voor de bedekte teelt van sla (*Lactuca* spp) en andijvie is niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat Naturalis in de bedekte teelt van sla (*Lactuca* spp) en andijvie op grote schaal toegepast wordt.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan.

© Geïmporteerd handelsmerk van CBC (Europe) S.r.l.

09 - 2021